

Ambex

Ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace - VP

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ambex musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

- 1) Co je přípravek Ambex a k čemu se používá
- 2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambex užívat
- 3) Jak se přípravek Ambex užívá
- 4) Možné nežádoucí účinky
- 5) Uchovávání přípravku Ambex
- 6) Další informace

Ambex

(Ambroxoli hydrochloridum)

Šumivé tablety

1.) Co je Ambex a k čemu se používá

Ambex patří do skupiny léků, které se nazývají expektorační, mukolytika, tyto léky usnadňují vykašlávání.

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambex, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťujících posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Přípravek je určen k mukolytické léčbě (snižuje viskozitu hlenu, čímž se usnadňuje jeho vykašlávání) akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění provázených zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Příkladem takových onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest a infekční onemocnění dýchacích cest (akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice).

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambex užívat?

Neužívejte Ambex:

Pokud trpíte známou přecitlivělostí na ambroxol nebo jiné látky obsažené v přípravku.

Přípravek se nesmí podávat dětem mladším 12 let.

Zvláštní opatření při použití přípravku Ambex je zapotřebí:

Šumivé tablety obsahují aspartam - zdroj fenylalaninu, proto jsou nevhodné pro pacienty s fenylketonurií (vrozené metabolické onemocnění, charakterizované vylučováním kyseliny fenylpyrohroznové močí).

Užívání přípravku Ambex s jídlem a pitím:

Přípravek se užívá po jídle.

Těhotenství a kojení

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Ambex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Než začnete současně s užíváním přípravku Ambex užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.

O klinicky významném působení s ostatními léky nejsou zprávy.

3.) Jak se přípravek Ambex používá?

Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

dospělí, mladiství a děti od 12 let - 1/2 šumivé tablety 3x denně.

U dospělých může být léčebný účinek zvýšen podáním 1 tablety 2x denně.

Délka užívání

Délka léčby přípravkem je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek maximálně 4-5 dní. Pokud se příznaky během tohoto týdne významně nezlepší, při zhoršování příznaků nebo při objevení hořčičky vyhledejte lékaře.

Způsob použití:

Šumivé tablety se rozpustí před požitím ve sklenici vody (asi ve 2 dcl) a roztok se vypije po úplném rozpuštění tablety. Užívají se po jídle.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Ambex, než jste měl(a):

Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, vyhledejte lékaře.

4.) Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení). Ojedinelé se mohou vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

5.) Uchovávání přípravku Ambex

Přípravek uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení:

10 nebo 20 šumivých tablet

6.) Další informace

Léčivou látkou je:

Ambroxoli hydrochloridum 60 mg v jedné šumivé tabletě

Pomocné látky jsou:

Dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitán sodný, povidon 25, sodná sůl sacharinu, aspartam, pomerančové aroma v prášku, makrogol 6000

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

WALMARK, a.s., Třinec, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum revize textu

24.9.2008

V 20761/2008