

## Emoxen GEL

## Příbalová informace – VP

## Informace pro použití, čtěte pozorně!

**Emoxen Gel**

Naproxenum  
Gel

**Držitel rozhodnutí o registraci**

EMO-FARM, Sp. z o.o., Ksawerów, Polsko

**Výrobce**

WALMARK, a.s., Třinec, Česká republika  
ve spolupráci s EMO-FARM, Sp. z o.o.

**Složení**

Léčivá látka: naproxenum 100 mg v 1 g gelu.

Pomocné látky: chloral-hydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný, čištěná voda.

**Indikační skupina**

Antiflogistikum, antirevmatikum

**Charakteristika**

Přípravek obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nereumatických stavů pohybového ústrojí.

**Indikace**

Přípravek je určen k léčbě poúrazových stavů jako jsou pohmožděliny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach a svalových úponů. K léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze použít Emoxen Gel pouze po doporučení lékaře. Používat se i v rehabilitační léčbě.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 12 let.

**Kontraindikace**

Přípravek se nesmí používat u pacientů se známou přecitlivělostí na naproxen, popř. jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, na salicyláty nebo na některou jinou složku přípravku. Nesmí se nanášet na narušenou pokožku, na rány nebo na místa s kožní infekcí. Nesmí ho používat pacienti, u kterých se po použití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých přípravků objevila alergická reakce (kožní vyrážka, obtíže s dýcháním). Přípravek se nesmí nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se to stalo, umyjte postiženou oblast a oči vypláchněte větším množstvím vody.

Přípravek nesmí používat ženy ve třetí třetině těhotenství a kojící matky. Ženy v první a druhé třetině těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by Emoxen Gel aplikovat na rozsáhlou oblast kůže nebo po dlouhou dobu.

Pouze na doporučení lékaře používají přípravek pacienti s onemocněním jater, ledvin, srdce a vředovým onemocněním žaludku a dvanácterníku.

**Nežádoucí účinky**

Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně závažnějšího charakteru. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže projevujícímu se kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním, ojediněle se může objevit přecitlivělost na světlo.

Během dlouhodobého používání přípravku nanášeného na velké plochy kůže mohou být pozorovány celkové nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o další léčbě přípravkem poraďte se svým lékařem.

V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se otoky v oblasti a dušností přerušete léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

**Interakce**

Vzájemné ovlivnění jiných současně užívaných přípravků není při kožním podání pravděpodobné. Přesto bez rady s lékařem nenanávejte na stejná místa jiné přípravky. O vhodnosti současného používání přípravku Emoxen Gel s jinými léky se poraďte s lékařem.

**Dávkování a způsob použití**

Lék Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání. Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděliny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) se aplikuje 2–6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez rady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo se aplikuje přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3–4x denně. Gel se jemně vetře do kůže, aby se lépe vstřebával.

Místa, na která je přípravek nanášen, se nesmí zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek se nesmí nanášet na velké plochy.

Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně.

**Upozornění**

Protože během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo, nesmíte během léčby a 2 týdny po léčbě vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích.

Přípravek neovlivňuje schopnost řízení motorových vozidel ani obsluhu strojů.

Předávkování zevně používaným přípravkem je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

**Uchovávání**

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**Varování**

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**Balení**

Hliníková tuba obsahující 50 nebo 100 g gelu.

**Datum poslední revize**

16. 4. 2008

V 18731/07