

SEPTOFORT 2 mg

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!

SEPTOFORT 2 mg

(Chlorhexidini digluconas)

pastilky

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:

WALMARK, a.s., Třinec, Česká republika

SLOŽENÍ:

Léčivá látka: Chlorhexidini digluconas (ut Chlorhexidini digluconatis solutio 20% 10mg) 2 mg v jedné pastilce.

Pomocné látky: Sorbitol, aroma máty peprné, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, zeleň složená 600938, aspartam.

INDIKAČNÍ SKUPINA: Otorhinolaryngologicum

CHARAKTERISTIKA: Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Přípravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro diabetiky.

INDIKACE: Přípravek je určen k prevenci a lokální léčbě infekcí dutiny ústní a horních cest dýchacích (afty, záněty dásní, jazyka, nosohltanu, stavy po operacích v dutině ústní nebo krku, po extrakcích zubů, eroze ústní sliznice různého původu apod.). Přípravek mohou užívat děti od 5 let, mladiství i dospělí.

KONTRAINDIKACE: Přípravek nesmí užívat nemocní přecitlivělí na chlorhexidin, sorbitol, aspartam nebo nemocní s fenylketonurií. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře. Nepodávat dětem do 5 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Při delším užívání přípravku se může ojediněle vyskytnout přechodné žlutohnědé zbarvení zubního povrchu a jazyka, dočasná porucha chuti a pálení jazyka, které po vysazení léku vymizí. U osob citlivých na sorbit se může objevit průjem, který po vysazení přípravku odezní. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušete užívání přípravku a poradte se s lékařem. Přecitlivělost na přípravek se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje s poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušete užívání přípravku a vyhledejte lékaře!

INTERAKCE: Účinky chlorhexidinu a látek obsažených v zubních pastách se mohou vzájemně rušit a proto je třeba používat zubní pasty a Septofort 2 mg s časovým odstupem. Jiné interakce nejsou známy.

DÁVKOVÁNÍ: Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí 3krát denně 1 pastilku po jídle. Pastilky se nechají volně rozplynout v ústech. Dětem od 5 do 12 let se podává 2krát denně ½ až 1 pastilka. Dětem od 12 let a mladistvým se podává 3krát denně 1 pastilka. Po užití pastilky se nesmí jíst a pít asi 1 až 2 hodiny. Stejně jako jídlo i zubní pasty mohou rušit účinek léku, proto mezi užitím pastilky a čištěním zubů musí uplynout nejméně půl hodiny. Po zmírnění obtíží je nutné užívat pastilky ještě 2 až 3 dny.

UPOZORNĚNÍ: O vhodnosti současného užívání přípravku Septofort 2 mg s jinými léky se poradte s lékařem. Pokud do 3 dnů nenastane výrazné zlepšení, nebo dojde-li dokonce ke zhoršení stavu, vyhledejte lékaře. U dětí s hořečkou se vždy poradte s lékařem již na počátku obtíží. Přípravek nepodávejte dětem do 5 let pro nebezpečí vdechnutí pastilky. Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte po uplynutí doby vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ: 12 nebo 24 pastilek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 3.9.2008

V 71502/2008